

## ラゲブリオ<sup>®</sup>カプセル 200mg(以下:この薬)を 服用する際の事前チェックリスト

説明者と患者さんで、以下の項目を必ず確認してください

- 妊娠している女性又は妊娠している可能性のある女性は服用できません。前回の月経後に性交渉を行った場合は妊娠している可能性があります。妊娠中又は妊娠している可能性がある場合は担当の医師、看護師又は薬剤師にお知らせください。なお、妊娠初期の妊婦では、妊娠検査で陰性を示す場合があることにご留意ください。
- 
- この薬は動物実験で、催奇形性などが認められております。
- 
- 妊娠する可能性のある女性は、本剤服用中及び服用終了後一定期間(少なくとも、服用終了後4日間)に性交渉を行う場合は、パートナーと共に適切な避妊を行ってください。
- 
- 万が一、薬が残ってしまった場合でも絶対に他の人に譲らないでください。  
・症状が良くなった場合でも5日間飲み切ってください。  
・副作用等で中止する場合には、医師、看護師又は薬剤師に相談してください。
- 
- この薬を服用中及び服用終了後一定期間(少なくとも服用終了後4日間)に妊娠した、あるいは妊娠していることがわかった場合には、直ちに医師、看護師、又は薬剤師に相談してください。