

検査項目対比表

| | | 被保険者 | | 被扶養者 | |
|--------------|---------------------------|----------|----|------|---|
| | | 一般 | 付加 | | |
| 診察等 | 質問（問診） | ○ | | ○ | |
| | 計測 | 身長 | ○ | | ○ |
| | | 体重 | ○ | | ○ |
| | | 腹囲 | ○ | | ○ |
| | | BMI・標準体重 | ○ | | ○ |
| | 視力 | ○ | | | |
| | 聴力 | ○ | | | |
| 胸部聴診・腹部触診 | ○ | | ○ | | |
| 血圧（座位） | ○ | | ○ | | |
| 脂質 | 総コレステロール定量 | ○ | | | |
| | 中性脂肪 | ○ | | ○ | |
| | HDL-コレステロール | ○ | | ○ | |
| | LDL-コレステロール | ○※1 | | ○ | |
| 肝機能 | GOT（AST） | ○ | | ○ | |
| | GPT（ALT） | ○ | | ○ | |
| | γ-GTP（γ-GT） | ○ | | ○ | |
| | ALP | ○ | | | |
| | 総蛋白 | | ○ | | |
| | アルブミン | | ○ | | |
| | 総ビリルビン | | ○ | | |
| | LDH | | ○ | | |
| | アミラーゼ | | ○ | | |
| 代謝系 | 空腹時血糖 | ■ | | ■ | |
| | ヘモグロビンA1c | ■ | | ■ | |
| | 随時血糖 | ■ | | ■ | |
| | 尿糖 | ○ | | ○ | |
| | 尿糖 | 半定量 | | ○ | |
| 血液一般 | 血清尿酸 | ○ | | | |
| | ヘマトクリット値 | ○ | | □ | |
| | 血色素測定 | ○ | | □ | |
| | 赤血球数 | ○ | | □ | |
| | 白血球数 | ○ | | | |
| | 血小板・血液像 | | ○ | | |
| 尿・腎機能 | 尿蛋白 | 半定量 | | ○ | |
| | 潜血 | ○ | | | |
| | 尿沈渣 | | ○ | | |
| | 血清クレアチニン（eGFRによる腎機能の評価含む） | ○ | | □ | |
| 呼吸 | 肺活量 | | ○ | | |
| | 1秒量・1秒率 | | ○ | | |
| 心機能 | 12誘導心電図 | ○ | | □ | |
| 肺 | 胸部X線 | ○ | | | |
| 胃 | 胃部X線 | ○ | | | |
| | 胃内視鏡 | ○※2 | | | |
| 大腸 | 直腸検査 | □ | | | |
| | 免疫便潜血反応検査 | ○ | | | |
| 眼底検査 | | □ | ○ | □ | |
| 腹部超音波 | | | ○ | | |
| 肝炎ウイルス検査 | HBs抗原 | ● | | | |
| | HCV抗体 | ● | | | |
| 子宮頸がん（スメア方式） | | △ | | | |
| 乳がん | X線・問診 | △ | | | |
| | 視診・触診 | □ | | | |

○ . . . 必須項目

△ . . . 受診者の希望に基づき選択的に実施する項目

□ . . . 医師の判断に基づき選択的に実施する項目

● . . . 35歳以上の者（過去に当該検査を受けたことがない者）の希望に基づき実施する項目

■ . . . いずれかの項目の実施で可（ただし、随時血糖の場合、食事開始後3.5時間以上経過していること）

※1. 中性脂肪が400mg/dl以上又は食後採血の場合、LDLコレステロールに代えて、Non-HDLコレステロールの測定でも可

※2. 胃内視鏡検査を実施した場合、胃部X線検査は実施しない